



ประกาศโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เรื่อง แนวทางป้องกันโรคติดต่อในแพทย์ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในผู้ป่วยและเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพในแพทย์ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการแก่แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นักศึกษาระดับหลังปริญญา ดังนี้

๑. ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมควรได้รับการตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือ รั่ววัคซีน ดังนี้
 - ๑.๑ Measles, Mumps and Rubella (MMR): ต้องได้รับการฉีดวัคซีน MMR เพื่อกระตุ้น ๑ เข็ม ถ้าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าได้รับวัคซีน MMR ภายใน ๑๐ ปี และไม่ได้กำลังตั้งครรภ์
 - ๑.๒ Varicella (Chicken pox): ถ้าไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ ต้องได้รับการฉีดวัคซีน varicella ๒ เข็มห่างกัน ๑ เดือน ถ้าไม่ได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกันหรือตรวจแล้วได้ผลลบสำหรับ varicella-zoster virus IgG antibody
 - ๑.๓ Hepatitis B: ต้องได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ได้แก่ antiHBs antibody (with titer) และ HBsAg โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้
 - ๑.๓.๑ HBsAb < ๑๐ iu/ml และ HBsAg ได้ผลลบควรได้รับวัคซีนตามแนวทางมาตรฐาน
 - ๑.๓.๒ HBsAb < ๑๐ iu/ml และ HBsAg ได้ผลลบควรได้รับคำแนะนำจากอายุรแพทย์
 - ๑.๓.๓ HBsAb > ๑๐ iu/ml และ HBsAg ได้ผลมีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
 - ๑.๔ Tetanus, Diphtheria and Pertussive: ควรได้รับการฉีดวัคซีน Tdap เพื่อกระตุ้น ๑ เข็มถ้าไม่ได้รับวัคซีนภายใน ๑๐ ปี
 - ๑.๕ Influenza: ควรได้รับการฉีดวัคซีนปีละ ๑ เข็ม เมื่อใกล้มีการแพร่ระบาดของโรค
๒. แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปัจจุบัน จำต้องดำเนินการเช่นเดียวกับในข้อ ๑ ยกเว้นในรายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าได้รับวัคซีนแล้วในช่วงระหว่างการฝึกอบรม และมีผลตรวจสำหรับ varicella-zoster virus IgG antibody ให้ผลบวก
๓. แพทย์/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ที่ประสงค์มาดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นานกว่า ๒ สัปดาห์และมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำต้องดำเนินการเช่นเดียวกับในข้อ ๑ โดยหน่วยงานซึ่งรับเป็นที่ดูงาน/ฝึกอบรมต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นการล่วงหน้า

๔. แพทย์ผู้รับการฝึกอบรมและนักศึกษาระดับหลังปริญญา จำต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษา โดยผู้ที่ต้องการให้ช่วยในการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันล่วงหน้า หรือช่วยจัดหาวัคซีนเพื่อฉีด (ในราคาทุน) สามารถติดต่อกับเลขาธิการกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม (โทร ๐๒ ๒๘๙ ๗๔๙๕)
๕. แพทย์ประจำบ้านทุกคนสวมใส่ Mask และ/หรือ Face shield CPE ชุดป้องกันตามความเหมาะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
๖. แพทย์ประจำบ้านทุกคนล้างมือด้วยสบู่หรือเจล Alcohol ทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย
๗. แพทย์ประจำบ้านที่เข้าทำหัตถการในห้องผ่าตัด ห้องคลอด
 - ๗.๑ กรณีผู้ป่วยทั่วไป ให้บุคลากรสวมชุดป้องกันและหน้ากากอนามัย/N๙๕/KN๙๕ โดยใช้หลัก Universal Standard Precaution
 - ๗.๒ กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการไข้ ไอ น้ำมูกที่ยังไม่ทราบผล nasopharyngeal swab COVID ๑๙ ให้บุคลากรสวมใส่อุปกรณ์ชุด PPE ตามคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE) ชนิด full PPE หรือ enhanced PPE ตามแต่ละชนิดของหัตถการ
 - ๗.๓ กรณีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID ๑๙ ให้บุคลากรใส่อุปกรณ์ชุด full PPE หรือ PAPR

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายพรเทพ แซ่เฮ้ง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์